

STELLINGEN

I

Bij behandeling van hypospadie zijn, aan een orthoplastiek door middel van een in lengterichting te sluiten dwarse incisie, belangrijke nadelen verbonden.

II

Bij het sluiten van een urethrafistel dient het gebruik van een katheter à demeure en een circulair verband vermeden te worden.

III

De indicatie tot radiotherapie van het haemangioma cavernosum dient met zeer veel reserve gesteld te worden.

Bek, V. en J. Kolar, *Radiobiol.-Radiother.* 3: 429, 1962.

IV

Immobilisatie van de vingergewrichten in zgn. 'physiologische middenstand' leidt tot rigiditeit van deze gewrichten.

Gorzynski, H., *Zschr. Arztl. Fortb.* 57: 335, 1963.

V

Groei en modificatie van een bot transplantaat vinden alleen plaats onder invloed van functionele 'stress'.

Mowlem, R., *Brit. J. Plast. Surg.* XVI: 293, 1963.

VI

Pijnklachten of de aanwezigheid van een grote hernia, vormen de enige indicatie tot operatie van cryptorchismus.

Johnsen, S. G., *Acta Endocrinologica*, Suppl. 66, Copenhagen 1962.

VII

Bij uitwendige hartmassage van kinderen, dient druk op het onderste deel van het sternum vermeden te worden.

Thaler, M. M. en G. H. C. Siobie, *New Engl. J. Med.* 269: 606, 1963.

VIII

Der Leib des Menschen ist etwas wesentlich anderes als ein Tierischer Organismus.

Heidegger, M., *Über den Humanismus*.