

STELLINGEN

1. Ter overbrugging van een symptomatische afsluiting van de arteria femoralis superficialis verdient het gebruik van vena saphena magna de voorkeur boven P.T.F.E.
2. Een femoropopliteale overbruggingsplastiek met P.T.F.E. is niet geïndiceerd bij patiënten met claudicatio intermittens.
3. Trombectomie van gethromboseerde P.T.F.E. femoropopliteale overbruggingsplastiek leidt zelden tot een blijvende doorgankelijkheid.
4. Klachten van perifeer atherosclerotisch vaatlijden komen bij niet-rokers niet voor.
5. Het gebruik van orale anticoagulantia door patiënten met een perifeer stenoserend vaatlijden beïnvloedt de progressie van dit lijden niet.
6. Na endoscopische poliepectomie van een colonpoliep, welke invasief groeiend carcinoom bevat en een tumorvrije steel, dient een colonresectie te worden verricht.
7. Ultrafiltratie is een eenvoudige en veilige methode om vocht te onttrekken aan ernstig overvulde patiënten met een onvoldoende te stimuleren diurese.
8. Percutane galblaasdrainage dient overwogen te worden bij patiënten met een acute cholecystitis en een sterk verhoogd operatierisico.
9. Legalisering van het gebruik van narcotica zou de criminaliteit, welke rond de gebruikers heerst, aanzienlijk doen afnemen.
10. The gods do not subtract from man's allotted time the hours spent on sailing.

2 september 1983

H.W. Tilanus.