

STELLINGEN

1. Hypothyreoidie als gevolg van oncologische behandeling van het hoofd/hals gebied dient tijdig opgespoord, herkend en behandeld te worden.
2. Endocriene therapie dient als afzonderlijke intern geneeskundige behandelingsmethode te worden onderscheiden van cytostatische therapie.
3. "Flare" (mogelijke voorbijgaande activatie van de tumorgroei) in het begin van hormonale therapie van gemetastaseerd mammacarcinoom betekent niet dat de therapie gestaakt moet worden.
4. Aan het beschrijven van het beloop van pleurale en peritoneale metastasen van het mammacarcinoom wordt te weinig aandacht besteed; toch reageren ze zeer goed op de therapie.
5. Bij botfracturen en compressies in het bestraalde veld bij patienten met gynaecologische tumoren spelen factoren zoals voorafgaande osteoporose, slechte voeding, malabsorptie, vaak een rol.
6. Aan de ondersteunende functie van de voeding bij de therapie van oncologische patienten dient meer aandacht te worden geschonken.

7. Since it has been well documented that the presence of the estrogen receptor is predictive of improved survival and longer disease-free periods, it is possible that patients who have progesterone-receptors comprise a group with a better prognosis.
Progesterone-receptor levels should be routinely measured and incorporated into future trials of adjuvant therapy.
Clark, G.M., et al., N.Engl.J.Med. 1983, 309.
8. Bij het toepassen van cytostatische therapie bij jonge personen dient men tijdig maatregelen te nemen tot behoud van fertiliteit.
9. It is usually extremely difficult to pinpoint a "primary" action of a hormone. Often the first effect induces a change of magnitude too small to be detected and leads to secondary, tertiary and higher order changes. The product of one reaction can serve as the substrate, inhibitor, activator, cofactor or even enzyme for the next reaction or it can influence the uptake or binding of essential cell components.
[Martin, C.R., Textbook of Endocrine Physiology, 1978.]
10. Er is nog altijd onduidelijkheid over de relatie tussen het gebruik van orale contraceptiva en het ontstaan van mammacarcinoom.
11. Consumptie van alcohol en roken creëren werk voor de volgende generatie van de artsen.
12. It is perhaps paradoxical that for twenty-five years or more a certain pre-occupation with fluid and electrolytes, vitamins, hormones and blood gases has appeared to divert the average clinician's attention from the two most fundamental requirements of every patient: adequate protein and sufficient calories.
[Butterworth Ch.E. and Blackburn G.L., Nutrition today, 10:8-18, 1975]

13. Ook de "onschuldige" in water-oplosbare vitaminen kunnen in megadoses schadelijk zijn.
Schaumburg H. et al., N.Engl.J.Med. 1983, 309.

14. As the use of adjuvant systemic therapy expands, it should be kept in mind that it may affect the biological characteristics of the tumor and modify the sensitivity of metastases to subsequent cytotoxic and/or endocrine therapy.
[Palshof T. In: Hormonal Management of Endocrine-Related Cancer. Ed.: Stoll, B.A., 1981]

15. Opticiëns zullen in de komende jaren veel winst maken door het toenemend gebruik van kopieerapparaten die normale tekst verkleinen.

